

藥物成分

劑型

編號

Metformin

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

伏糖錠 500 毫克/錠 (Loditon)

庫魯化錠 500 毫克/錠 (Glucophage)

驅糖樂持續錠 500 毫克/錠 (C.T.L XR)

庫魯化錠 850 毫克/錠 (Glucophage 850mg)

☞ 藥品作用

本藥可增加胰島素的敏感性，達到控制血糖的效果，主要用來治療第二型糖尿病，亦能治療多囊性卵巢症或其他疾病。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1~3 次，隨餐或飯後立即服用。
2. C.T.L XR 須整粒吞服，可剝半不可壓碎磨粉。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是酮酸中毒病史、高血糖高滲透壓非酮性昏迷、嚴重感染、腎臟或肝臟功能異常或要進行外科手術。
2. 請告訴醫師/藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 服用本藥不得飲酒，酒精會加重副作用產生。
4. 如要接受含碘化物顯影劑的放射性診斷檢查(常見有尿道攝影、肝膽道攝影、血管攝影、斷層掃描等)，本藥須在檢查前後 48 小時停止使用。
5. 常見副作用為腹瀉、噁心或嘔吐等腸胃道不適，但一般都不嚴重，可回診時告知醫師。
6. 可能會出現極罕見的乳酸中毒副作用，若有呼吸急促、昏睡、酸痛、全身不適、畏寒、眩暈等症狀請立刻就醫。
7. 單獨使用本藥極少出現低血糖，但若與其他有低血糖副作用的降血糖藥物併用時，須特別留意低血糖及監測血糖。
8. 懷孕等級 B，若女性懷孕或計畫懷孕請告知醫師/藥師；哺乳對嬰兒風險很小，若有哺乳需求請事先諮詢。