

藥物成分

劑型

編號

Lercanidipine

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

利壓膜衣錠 10 毫克/錠 (Zanidip F.C.)

☞ 藥品作用

此藥主要作用是直接對血管平滑肌之擴張作用而降低周圍血管之阻力，進而降低血壓。

☞ 服用方式

1. 通常一天 1 次，每次 1 粒，建議可早飯前 15 分服用。
2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾對鈣離子阻斷劑(血壓藥)過敏。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，是否有藥品過敏史及您目前正在服用的其它藥物，特別是 cyclosporine、cimetidine 等，因為有許多藥會影響藥效。
3. 服藥期間，請勿吃葡萄柚或喝葡萄柚汁。
1. 本藥可能會有**暈眩或姿勢性低血壓**的副作用，如果從躺臥或坐姿要起立時應小心，不要太快避免暈眩，服藥初期在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
2. 常見副作用為頭痛、潮紅、水腫、眩暈及心悸(心跳加快)、疲倦，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 如果有下列症狀，請立刻就醫：出現無力、皮疹(包括紅斑和搔癢)、胃部疼痛不適、噁心、多尿、齒齦增生以及視力異常的情形。
4. 孕期及授乳期都沒有足夠的安全資料，可能對胎兒/嬰兒有影響，女性計畫懷孕/已懷孕或有哺乳需求請告知醫師。