



藥物成分

劑型

編號

Methotrexate

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

治善錠 2.5 毫克/錠 (Trexan)

☞ 藥品作用

可本藥可作為抗腫瘤或免疫抑制劑，臨床常用在絨毛性腫瘤、妊娠滋養層疾病(葡萄胎)、白血病、皮癬、類風濕性關節炎、自體免疫疾病或其他醫療用途。

☞ 服用方式

1. 通常每 12 小時 1 粒服用 3 次，或每 8 小時一次服用 4 次，也可 1 天 1 粒共服用 5 天；類風濕性關節炎或皮癬通常**每星期分 3 次服用**，每次 1~3 粒。(非每日服用)
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**顯著的肺部疾病、嚴重感染、嚴重消化道潰瘍、免疫性疾病、血液性疾病(如白血病或貧血)、或肝腎功能不良。**
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是**抗生素、phenytoin、盤尼西林或磺胺類藥、消炎止痛藥、含葉酸的維他命、其他化療藥物或正進行放射線治療。**
3. 此藥可能會增加曬太陽產生的過敏(如:紅疹)，服藥期間請避免過度曝曬，並注意防曬措施(遮陽帽/傘、防曬乳)。

(續下頁~)



注意事項~續

4. 服藥期間請勿飲酒，酒精會增加肝臟的負擔與傷害。
5. 服藥期間若要施打活性疫苗請事先諮詢醫師。
6. 本藥可能會使您的免疫力降低，若要出入公眾場所請戴口罩，避免接觸傳染病患者或污物，勿生食，注意個人衛生 避免受傷。
7. 若長期使用建議定期檢測血球及肝腎功能。
8. 本藥可能會讓人暈眩/疲倦，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
9. 常見副作用為頭痛、厭食/嘔吐、腹瀉、口腔炎、掉髮，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
10. 如果有下列症狀，請立刻回診或就醫：皮膚/眼睛變黃、不明發燒/虛弱、皮疹/紅斑、肺炎、視力改變或模糊、不明的瘀血或出血、情緒或認知障礙、血便/黑便。
11. 本藥曾被報導過可能發生極罕見的皮膚不良反應：皮膚紅疹或嘴破(且合併類流感的症狀，像是發燒、顫慄、肌痛或噁心嘔吐)，如有類似症狀請立即停藥並就醫。
12. 懷孕等級 X，懷孕期間不建議使用，若女性計畫懷孕請告知醫師；本藥禁止於哺乳期間使用。
13. 男性患者服藥期間亦須避孕，並持續到停藥三個月後。