



藥物成分

Danazol

劑型

口服藥

編號

药品商品名及含量

可達娜膠囊 200 毫克/膠囊 (Kodazol)

药品作用

本藥為藉抑制性腺體質的腦下垂體的輸出而壓制腦下垂體分泌。可用於治療子宮內膜異位症、囊狀慢性乳腺炎、乳腺肥大、乳痛、月經過多、纖維性囊腫性乳房疾病。

服用方式

1. 通常每日 2 次，每次 1-2 粒。
2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。
若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心血管疾病、肝或腎功能不良、不正常的生殖器出血。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗凝血劑 warfarin、statin 類降血脂藥、glimepiride、抗癲癇藥 carbamazepine、免疫抑制劑 cyclosporine 和 tacrolimus。
3. 服藥期間，請定期檢測肝功能及血液學檢查。
4. 可能會增加曬太陽產生的過敏，服藥期間請避免過度曝曬，並注意防曬措施。
5. 長期服藥可能會無月經或不規則，這是正常的不用擔心，一般停藥 2-3 個月內會恢復月經。
6. 常見副作用為月經不規則、停經、陰道乾澀或刺激、性慾改變、臉部潮紅、出汗、痤瘡、體重增加、輕微多毛症、皮脂漏，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：皮疹、皮膚或眼睛泛黃、視覺異常、持續性頭痛、聲音嘶啞、咽喉痛、禿髮、四肢疼痛腫脹、皮膚色素改變、剝落性皮膚炎。
8. 懷孕等級 X，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。