



藥物成分
Crizotinib

劑型
口服藥

編號

☞ 藥品商品名及含量

截剋瘤膠囊 250 毫克/膠囊 (Xalkori)

☞ 藥品作用

Crizotinib 是一種標靶治療藥物，適用於檢測出特定基因型突變的非小細胞肺癌患者的治療。

☞ 服用方式

1. 通常初始劑量為每日 2 次，每次 1 粒，飯前飯後皆可。
2. 膠囊應整粒配水吞服，並且不可壓碎、溶解或打開。
3. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若距離下一次服藥不到 6 小時，在下次用藥時間服用 1 劑即可，切勿為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心律不整、胃腸穿孔、肺部發炎、腎、肝功能不良等病史。
2. 請告訴醫師/藥師您是否有在服用其他藥物，如 CYP3A4 抑制劑：抗病毒藥(蛋白酶抑制劑)、azole 類抗黴菌劑、巨環類抗生素 (clarithromycin)；強效 CYP3A4 誘導劑、抗癲癇藥、抗結核病藥、聖約翰草；midazolam、quinidine、verapamil、diltiazem、digoxin。
3. 服藥期間應避免食用葡萄柚(汁)，會影響藥物代謝。
4. 本藥可能讓嗜中性白血球較低，請出入公共場合時戴口罩、勿生食(水果去皮)、不要接觸感冒的人/土壤/汙物/排泄物、小心避免自己受傷，並隨時注意自己有沒有感冒/喉痛、虛弱/發燒或小便灼熱疼痛等症狀。
5. 常見副作用為嗜中性白血球減少、食慾降低、視覺障礙(模糊/飛蚊)、噁心嘔吐、腹瀉、便秘、疲倦、水腫等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：視力弱化、虛弱合併眼白/皮膚變黃、過敏皮疹、心跳異常(<50 下/分鐘)、胸痛/呼吸困難。
7. 懷孕等級 X，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，在療程中及療程結束後至少 90 天內應採取適當的避孕措施。本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間應避免餵哺母乳。