



藥物成分

劑型

編號

Bezafibrate

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

倍利脂緩釋錠 400 毫克/錠 (Bezalip Retard Coated)

☞ 藥品作用

高膽固醇血症、高脂質血症。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 餐後或隨餐整顆吞服，**不可剝半或磨粉**。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**肝臟或腎臟疾病者**。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗凝血藥 warfarin 及單胺氧化酵素抑制劑者。
3. 常見副作用為腸胃道不適(沒胃口、腹部脹滿及噁心)，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：
 - A. 不明肌肉疼痛或壓痛、無力、嚴重腹痛、噁心、嘔吐。
 - B. 不明原因的發燒。
 - C. 過敏反應（搔癢或蕁麻疹、臉部或手部水腫、嘴部或喉嚨水腫、胸悶或呼吸困難）。
 - D. 水泡、脫皮或皮膚紅疹，眼睛或皮膚變黃，尿液變深或糞便顏色變白。
5. 孕期資料不足，無法排除胎兒風險，**女性計畫懷孕或已懷孕請務必告知醫師**，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。