



藥物成分

劑型

編號

Apixaban

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

艾必克凝膜衣錠 5 毫克/錠 (Eliquis F.C.)

☞ 藥品作用

本藥是一種凝血因子抑制劑，用於成人非瓣膜性心房纖維顫動患者併有其他危險因子者，預防發生中風與全身性栓塞。

☞ 服用方式

1. 通常每日 2 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對此藥物過敏、有出血傾向疾病、**肝腎功能不良**、心臟人工瓣膜置換、胃潰瘍病史、接受透析治療的患者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 **aspirin** 與其他抗血小板藥物、其他抗凝血劑、肝素、血栓溶解劑以及**非類固醇性消炎止痛藥 (NSAIDs)**。
3. **本藥作為預防栓塞需長期定時服用**，突然停用而未繼續施以適當的抗凝血治療會升高患者發生中風的風險。
4. 如有要開刀或拔牙，請事先告訴醫師或牙醫師或藥師您正在服用此藥。
5. 常見副作用為**增加出血機率**，通常是輕微的，如牙齦出血、鼻出血、血腫、經血過多等，一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. **如果有下列症狀，全身大量出血、傷口流血不止、血尿、血便/黑便、咳血、直腸出血、肌肉出血等，請立刻就醫。**
7. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。