

藥物成分

劑型

編號

Rifampin

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

立汎黴素膠囊 150 毫克/膠囊 (Rifampin 150mg Cap)

瑞比新膠囊 300 毫克/膠囊 (Rifampicin 300mg Cap)

## ☞ 藥品作用

本品為殺菌性抗生素，適用肺結核、奈瑟氏腦膜炎、球菌帶原者的治療。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次的量會隨病情或病人體重而定。最好於早飯前 30 分~1 小時服用，請配服 240 毫升以上的水，可增加吸收；但若有腸胃道副作用產生，也可與食物併服。
2. 即使症狀改善也請確實完成療程，避免產生抗藥性。
3. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**肝臟疾病**、**酒精濫用**。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是口服避孕藥、口服抗凝血劑、人類免疫不全病毒藥品。
3. 服藥期間，**不建議併用酒精**，酒精可能會增加肝臟負擔。
4. 本藥可能會影響口服避孕藥，請使用**第二種避孕方法**。
5. 請不要與大量乳酪起司、紅酒同時服用，避免副作用產生。
6. 可能會出現**橘紅色尿液或淚液** (若配戴隱形眼鏡可能會著色)。
7. 常見副作用為**噁心、嘔吐、腹瀉、食慾不振、疲倦、感冒症狀**等現象，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
8. 如果有下列症狀，請立刻就醫：
  - A. **寒慄、呼吸困難、暈眩、頭痛、肌肉及骨骼疼痛。**
  - B. **不明原因的發燒。**
  - C. **搔癢或蕁麻疹、臉部/口腔或喉嚨水腫破皮、胸悶。**
  - D. **排尿量/次數大為降低、異常瘀傷/出血、眼睛眼白處變黃。**
9. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。