



藥物成分

劑型

編號

Acetazolamide

口服藥

药品商品名及含量

乙醯胺基硫唑嘧啶 250 毫克/錠 (Acetazolamide)

药品作用

治療青光眼或當利尿劑使用及癲癇輔助治療。對高山症的頭痛、噁心及呼吸困難等症狀有緩解作用。

服用方式

- 通常每日 1~4 次，每次 1~2 粒，飯後服用。
- 控制青光眼眼壓，必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。
- 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

注意事項

- 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對 sulfonamides、thiazide 利尿劑有過敏反應者、糖尿病、甲狀腺功能異常、痛風、肺疾病、肝腎功能異常。
- 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 amphotericin B、corticosteroids 或 cyclosporine。
- 可能引起暈眩及注意力不集中，應避免從事開車或操作機械等需要警覺力的工作。
- 服用本藥物建議定期檢查血液及電解質數值。
- 本藥常見副作用為排尿困難、噁心嘔吐、味覺喪失、發疹、昏眩、耳鳴等。但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
- 如果有下列症狀，請立刻就醫：口腔金屬味、手腳口唇麻木、體重減輕。**
- 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，若有必要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。