



藥物成分	劑型	編號
Azilsartan	口服藥	

## ☞ 藥品商品名及含量

易得平錠 40 毫克/錠 (Edarbi)

## ☞ 藥品作用

是一種血管加壓素II-接受體拮抗劑，作用於腎素-血管收縮素-醛固酮系統，可單一使用或和其他高血壓用藥併用於治療高血壓。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1-2 粒，飯前飯後皆可。
2. 本藥易受光線與水氣影響，請保存在原鋁箔包裝內，使用前才拿出，如果有需要分裝也請連同鋁箔包剪開。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是重度腎功能不全、腎動脈狹窄；準備懷孕或哺乳。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是鋰鹽、非類固醇消炎藥、保鉀利尿劑。
3. 如有需全身麻醉手術，請事先告訴醫師正在服用此藥。
4. 常見副作用為暈眩、腹瀉、噁心、疲倦、乾咳、肌肉痙攣、低血壓，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：血管性水腫（如口腔、眼眶、嘴唇周圍水腫）。
6. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。