



藥物成分	劑型	編號
Levetiracetam	口服藥	

☞ 藥品商品名及含量

優閒膜衣錠 500 毫克/錠 (Keppra F.C.)

希樂平膜衣錠 1000 毫克/錠 (Pharacetam F.C.)

☞ 藥品作用

抗癲癇藥物，治療成人及四歲以上孩童之癲癇局部發作的輔助治療。

☞ 服用方式

1. 每日 2 次，每次劑量依醫師處方指示。飯前或飯後均可。
2. 非經醫師指示請勿擅自停藥，突然停藥可能會引起癲癇發作，或增加發作頻率。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病：對本藥主成份 levetiracetam 或對其他 pyrrolidone 衍生物敏感；腎、肝功能不良者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是：葉酸拮抗劑 methotrexate。
3. 本藥可能引起嗜睡、暈眩及無力感，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械及從事具潛在危險之活動。
4. 常見副作用為鼻咽炎、睏倦、頭痛、疲勞、咳嗽，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果出現憂鬱症及/或自殺意念或行為、嗜睡、精神激昂、具攻擊性、意識障礙、呼吸抑制、昏迷，請立刻就醫
6. 懷孕等級為 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。