



藥物成分	劑型	編號
Bisoprolol	口服藥	

### ☞ 藥品商品名及含量

- 百適歐膜衣錠 5 毫克/錠 (Biso F.C.)
- 匹梭膜衣錠 1.25 毫克/錠 (Bisol F.C.)

### ☞ 藥品作用

可降低心跳、心輸出量和耗氧量，臨床上用於控制狹心症、高血壓和穩定型慢性中度至重度心衰竭。

### ☞ 服用方式

1. 通常每天 1 次，每天總量 2.5~10 毫克。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

### ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對於乙型(Beta)交感神經阻斷劑過敏、支氣管過敏、阻塞性肺部疾病或心跳過慢(小於每分鐘 60 下)等。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是鈣離子拮抗劑、clonidine、單胺氧化酶抑制劑(B 型除外)等。
3. 因為這個藥會讓心跳變慢，糖尿病病友服用後可能使低血糖副作用發生時的心跳過速不明顯，請病友注意。
4. **本藥用來保護心臟時需長期定時服用**，若已長期服用未經醫師許可請勿任意突然停藥，可能會導致病情惡化。
5. 常見副作用為四肢冰冷、疲倦無力、頭暈，偶爾可能會引起皮膚紅疹、腸胃不適，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：呼吸困難、心跳不規則且變慢、不尋常出血。。
7. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。