

藥物成分

劑型

編號

Azathioprine

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

雅迅靈膜衣錠 50 毫克/錠 (DP-Azathioprine F.C.)

安思平膜衣錠 50 毫克/錠 (Asazipam F.C.)

☞ 藥品作用

本藥是種免疫抑制劑，可治療全身性紅斑狼瘡、重度風濕性關節炎、急慢性白血病或作為器官移植手術防止排斥發生。

☞ 服用方式

1. 通常一日 1 次，每次 1~3 粒(須根據體重判定)。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。
若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是先天性代謝異常症(Lesch-Nyhan 症、TPMP 缺乏症)、水痘、嚴重感染或肝腎功能不良。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗病毒藥 ribavirin、降尿酸藥 allopurinol、sulphasalazine、降血壓藥 (ACEI、ARB)、骨髓抑制劑或 warfarin。
3. 若需至其他醫療院所看診，請務必告知醫療人員有使用本藥。
4. 使用本藥期間請盡量避免注射活性疫苗。
5. 請將本藥保存在幼童無法取得處，也絕不可給予別人使用。
6. 長期使用建議定期監測血球及肝腎功能。
7. 此藥會讓您抵抗力較弱，請盡量避免接觸傳染病人群，並加強個人平時衛生習慣，若有傷口請保持清潔。
8. 常見副作用為噁心/嘔吐、掉髮、腹瀉或腹痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
9. 服藥後若發生下列症狀：皮膚/眼睛變黃、不明發燒/虛弱、皮膚發疹/紅斑、喉嚨痛、肺炎、不明的瘀血/出血、強烈腹痛、腹瀉不止或血便，請立刻就醫或回診。
10. 本藥懷孕及哺乳期間都不建議使用，女性計畫懷孕或已懷孕或有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。