



藥物成分

劑型

編號

Methimazole

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

甲硫嗎唑錠 5 毫克/錠 (Methimazole)

## ☞ 藥品作用

抑制甲狀腺激素的合成，有效治療甲狀腺機能過高症，用於治療甲狀腺功能過高症及作為甲狀腺切除術之補助治療劑。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 2 次，每次 1~2 粒，本藥依臨床症狀而劑量差異很大，請配合臨床醫師指示。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是血液方面的疾病，如：白血球減少症(leukopenia)，血小板減少症(thrombocytopenia)，再生不良性貧血或是肝臟疾病(肝炎，黃疸)。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是**碘及碘化物、抗凝血劑(如 Warfarin)**。
3. 如果有要開刀或拔牙，請告訴其他科別的醫師或牙醫師您正在服用此藥。
4. 常見副作用為皮膚發疹、蕁麻疹、噁心，嘔吐等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. **如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重持續發燒或不明的低燒合併虛弱、寒顫、頭痛、眼睛或皮膚變黃(黃疸)、聲音嘶啞、口內炎、喉嚨發炎或疼痛、右側腹痛且食慾不振、皮膚出疹、身體不適、關節紅腫痛、異常出血或瘀青。**
6. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。