



藥物成分	劑型	編號
Milnacipran	口服藥	

☞ 藥品商品名及含量

解鬱優膠囊 50 毫克/膠囊 (Milnacipran)

☞ 藥品作用

是一種選擇性血清素及正腎上腺素再吸收抑制劑，可用來治療重度憂鬱症或纖維肌痛症。

☞ 服用方式

1. 通常每日 2 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心血管疾病、癲癇、肝、腎功能不良病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是單氧化酶抑制劑、洋地黃類藥物 digoxin、NSAID 類藥物、抗凝血藥、BZD 類藥物、其他精神疾病相關藥物。
3. 開始服藥須約 4 週後才會開始發揮藥效，請耐心維持醫囑。
4. 本藥在開始服藥期間，應特別注意情緒的變化，若有出現類似憂鬱情緒惡化、自殺意念、機動焦躁、恐慌或不尋常的行為，請立即回診或告知醫師。
5. 常見副作用為噁心、嗜睡、口乾、失眠、心跳變快、便秘、排尿不順、食慾改變、視力模糊、流汗增加、性慾改變，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：抽筋、紅疹/皮疹/搔癢、呼吸或吞嚥困難、心跳不正常、言語困難。
7. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。