

藥物成分

劑型

編號

Acarbose

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

醣祿錠 50 毫克/錠 (Glucobay)

抵克醣錠 50 毫克/錠 (Deglu)

☞ 藥品作用

本藥可抑制腸道內負責分解醣類的酵素，能延遲並減少飯後血糖升高，主要用來治療第二型(非胰島素依賴型)糖尿病。

☞ 服用方式

1. 通常每日 3 次，**建議在每餐時與第一口食物一起咬碎吞下。**
2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用餐時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是明顯消化吸收障礙、重度疝氣、大腸激躁症、腸阻塞或肝腎功能不全。
2. 請告訴醫師您是否有在服用其他藥物，特別是 digoxin、aspirin。
3. 若有使用腸吸附劑、Cholestyramine 及消化酵素製劑，須與本藥需隔開最少 2 小時使用
4. 常見副作用為胃腸脹氣、腹瀉、腹痛、噁心(較少見)，但通常不嚴重，可藉由減少食用碳水化合物改善，且一般過幾周症狀會慢慢消失，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 服藥後若發生下列症狀：**皮膚過敏反應、水腫、腹部劇烈絞痛、皮膚/眼睛變黃**，請立刻就醫或回診。
6. 單獨使用本藥極少出現低血糖，但若與其他有低血糖副作用的降血糖藥物併用時，須特別留意低血糖及監測血糖。
7. 使用本藥若發生低血糖時，不可服用非單醣類糖分作補充(例如蔗糖、糖果或家用糖)，**須使用果糖或葡萄糖作補充。**
8. 懷孕等級 B，若女性計畫懷孕請告知醫師/藥師；本藥資料不足無法排除嬰兒風險，不建議於哺乳期間使用。