



藥物成分	劑型	編號
Pentosan Polysulfate Na	口服藥	

☞ 藥品商品名及含量

優而順膠囊 100 毫克/膠囊 (Urosan)

☞ 藥品作用

本藥具有輕微抗凝血及纖維蛋白溶解的效果，主要用來治療因間質性膀胱炎引起的膀胱疼痛或不適。

☞ 服用方式

1. 通常每日 3 次，每次 1 粒。
2. 建議可在飯前 1 小時或飯後 2 小時和開水一同服用。
3. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝素引起之血小板低下症(HIT)。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是**非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs)**、**抗凝血藥與抗血小板藥(如阿斯匹靈 aspirin)**。
3. 請務必告訴醫師或藥師，您目前或曾有過的疾病，如：動脈瘤、血小板減少症、**血友病**、**胃腸潰瘍**、**息肉或憩室**、**肝功能不全**、**脾臟異常**等。
4. 常見副作用為**下痢**、**噁心**、**頭痛**、**掉髮**、**皮疹**、**消化不良**、**腹痛**、**肝功能異常**、**頭暈**，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**嚴重腹瀉/噁心**、**食道炎(胸口灼熱感)**、**嚴重腹痛**、**不明出血/皮膚嚴重瘀青**、**血便/血尿/黑便**、**虛弱/發燒**、**呼吸困難**、**耳鳴**、**視覺變化/弱視**。
6. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。本藥品哺乳資料尚不足，但有需要哺乳仍請事先諮詢醫師/藥師。