



藥物成分
Vinorelbine

劑型
口服藥

編號

☞ 藥品商品名及含量

溫諾平軟膠囊 20 毫克/軟膠囊 (Navelbine)

☞ 藥品作用

是一種半合成長春花鹼，能抑制細胞分裂，可用來治療非小細胞肺癌。

☞ 服用方式

- 劑量依病況而有所不同，請在用餐時以水整顆吞服(不可嚼食或剝開膠囊)，**若膠囊有任何破損都不應再使用**。
- 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

- 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腸胃吸收有問題者、曾有大範圍的胃或小腸切除病史者或嚴重肝功能不良病史者。
- 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 phenytoin、cyclosporine、tacrolimus、itraconazole、mitomycin C，需接種活性疫苗時，可能導致活性疫苗感染風險增加。
- 若不慎接觸到膠囊裡的液體，請使用大量清水漱口或沖洗，或用生理食鹽水更佳。(本藥有黏膜及皮膚的刺激性)
- 本藥有骨髓抑制之副作用，可能會使白血球較低，**請出入公共場合時戴口罩、勿生食(水果去皮)、不要接觸感冒的人/土壤/汙物/排泄物、小心避免自己受傷，並隨時注意自己有沒有感冒/喉痛、虛弱/發燒或小便灼熱疼痛等症狀**。
- 常見副作用為骨髓抑制，主要導致嗜中性白血球減少症、感覺神經障礙、噁心，可能出現輕微毛髮脫落、疲勞/倦怠、體重下降，但一般不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
- 如果有下列症狀，請立刻就醫：麻痺性腸阻塞。**
- 本藥可能對胎兒造成傷害，服藥期間需採避孕措施，本藥會分泌到母乳裡，服藥期間不可哺乳。
- 本藥須保持原始包裝儲存於攝氏 2-8 度(冷藏)。**