

藥物成分

劑型

編號

Benzbromarone

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

優力康錠 50 公絲/錠 (Euricon)

祛酸利膠囊 100 毫克/膠囊 (Benzro)

## ☞ 藥品作用

痛風、高尿酸血症。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1-3 次，每次 1 粒。

2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是尿酸性腎臟結石或肝、腎功能不良。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 Coumarin 系抗凝血劑。
3. 急性痛風發作時，不可開始使用本藥物。
4. 服藥期間請每天攝取足夠水分(2000c.c.以上)，服藥期間避免食用過量的維生素 C，以免增加體內尿酸滯留或腎結石的機會。
5. 常見副作用為噁心、腹瀉，一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 在使用期間如果有肝臟不良反應之症狀如：食慾不振、噁心嘔吐、疲倦虛弱、腹痛、下痢、發燒、深色尿液、結膜變黃等症狀，應停藥並立即就醫。
7. 本藥禁用於懷孕女性，女性計畫懷孕或已懷孕以及哺乳請事先告知或諮詢您的醫師。