



藥物成分	劑型	編號
Diltiazem	口服藥	

☞ 藥品商品名及含量

一般劑型	卡迪爾錠 30 毫克/錠 (Cartil) 合必爽錠 30 毫克/錠 (Herbesser)
緩釋劑型	凱帝心徐放錠 90 毫克/錠 (Cardizem Retard) 保樂康緩釋膠囊 180 毫克/膠囊 (Progor)

☞ 藥物作用

1. 治療高血壓。
2. 使血管擴張，減輕心臟負擔。
3. 增加提供心臟的血液及氧氣，以控制心絞痛。

☞ 服用方式

1. 本藥有兩種劑型。一般劑型通常一天3次，每次1粒。
2. 緩釋劑型通常一天1次，每次1粒，緩釋劑型原則上皆需整粒吞服，不可嚼碎/剝半或研磨。
凱帝心徐放錠不可剝半、磨粉或任何形式的破壞錠劑；保樂康緩釋膠囊可打開膠囊但不可磨碎裡面的微粒。
3. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。
若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請先告知您的醫師，是否有藥品過敏史及您目前正在服用的其它藥物，特別是心臟用藥或血壓用藥(β -blockers、digoxin、quinidine/利尿劑)、cimetidine、cyclosporine、fentanyl、抗憂鬱劑、青光眼用藥、theophylline。
2. 如果您曾/現有腎及心臟、肝臟等疾病，應告知您的醫師。
3. 服藥期間請勿過量飲酒，酒精會擴張血管可能會加重暈眩的副作用。

注意事項~續

4. **本藥用來保護心臟時需長期定時服用，若已長期服用未經醫師許可請勿任意突然停藥，可能會導致病情惡化。**
5. 少數人服用本藥可能會暈眩或有姿勢性低血壓的副作用，如果從躺臥/坐姿要起立時應加小心，不要太快避免暈眩，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
6. 曾有罕見牙齦腫大的副作用報導，服用本藥請記得日常口腔清潔，並定期半年至1年至牙科洗牙。
7. 常見的副作用是頭痛、潮紅、水腫(尤其是下肢)、眩暈、咳嗽、心律失常(較常見變慢)，這些情況通常是暫時性的，並在持續服用後通常可慢慢適應，且一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
8. **若您有下列任一症狀：胸痛、心跳不規律(心跳過快)、下肢或周邊嚴重水腫(體重突然上升)、皮膚紅疹、不尋常的疲勞或虛弱、氣喘或呼吸困難等症狀持續數日或嚴重時請停藥並立即就醫或與醫師連絡。**
9. 懷孕等級 C，目前懷孕期安全性資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕就診時請務必告知醫師。哺乳期對嬰兒風險低，但仍需更多資料，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。