



藥物成分	劑型	編號
Acetaminophen	口服藥	

☞ 藥品商品名及含量

理冒伯樂止痛錠 500 毫克/錠 (Fucole Paran)

得百利寧錠 500 毫克/錠 (Depyretin)

☞ 藥品作用

退燒、止痛。

☞ 服用方式

1. 12 歲以上與成人通常每日 4 次，每次 1~2 錠；兒童使用量會參酌體重或年齡計算。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝臟疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 isoniazid。
3. 請告訴醫師或藥師是否有酒精濫用史，服藥期間請勿飲酒的飲料及食物。
4. 常見副作用為皮膚紅疹、噁心、嘔吐、便秘、頭痛等症狀，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列過敏症狀，請立刻停藥就醫：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢。
6. 目前未有明確證據在懷孕婦女中使用，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。本藥分泌到母乳的量稀少，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。