

藥物成分

劑型

編號

Sorafenib

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

蕾莎瓦膜衣錠 200 毫克/錠 (Nexavar F.C.)

☞ 藥品作用

本藥為**抗腫瘤標靶藥物**，可阻斷訊息傳遞進而抑制血管新生及癌細胞生長，用於治療晚期之肝癌、腎細胞癌與甲狀腺癌。

☞ 服用方式

1. 通常每日 2 次，每次 2 粒，須於**空腹時**(至少用餐前 1 小時或是用餐後 2 小時)服用，不可以與食物一同服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否對藥物過敏或是有其他疾病；尤其是有心律不整(QT 間隔延長)、**腸胃道潰瘍**(特別是胃腸穿孔)、**肝功能不良**。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是以下：warfarin、phenytoin、phenobarbital、carbamazepine、dexamethasone、rifampin、fluorouracil、neomycin。
3. 常見副作用為腹瀉、手足皮膚反應(手腳出現紅腫、刺麻腫痛感、脫屑、水泡等)、出疹、疲倦感、噁心、嘔吐，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**過敏反應(包括蕁麻疹、搔癢、臉/手部腫脹、咽喉痛與呼吸困難)、出血症狀(黑便、暗褐色尿液、咳血、嚴重腹痛與異常出血或瘀青)**。
5. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。服藥期間以及停藥後，應至少持續 2 個星期維持有效的避孕措施。