



藥物成分

劑型

編號

Lamotrigine

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

樂命達錠 50 毫克/錠 (Lamictal)

樂命達錠 100 毫克/錠 (Lamictal)

## ☞ 藥品作用

穩定神經膜及抑制神經傳導物質釋放，用來治療癲癇症及鬱期雙極性情感症狀或鬱躁期循環的雙極性情感症狀之預防。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1~2 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是癲癇、肝腎功能不良病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗癲癇藥、抗肺結核藥 rifampin、抗病毒藥 lopinavir、減肥藥 orlistat、口服避孕藥或其他荷爾蒙替代療法。
3. 本藥可能會讓人暈眩、嗜睡，在還沒確定對你有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 開始服藥須約 4 週後才會開始發揮藥效，請耐心維持醫囑。
5. 常見副作用為皮疹、頭痛、視力模糊、噁心、嘔吐、疲倦，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛)、史蒂文生強生症候群(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等)。
7. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。