

藥物成分

劑型

編號

EMB/INH/PZA/RMP

口服藥

藥品商品名及含量

(EMB: Ethambutol, INH: Isoniazid, PZA: Pyrazinamide, RMP: Rifampicin)

立克核-4 膜衣錠 275+75+400+150 毫克/錠 (AkuriT-4 F.C.)

藥品作用

AkuriT-4是四種藥物固定劑量組合的抗肺結核藥物，提供給病患在結核病治療時，服用方便且簡單的劑型。本藥需正確連續服用，療程為6個月到2年不等。

服用方式

1. 通常每天 1 次，每次 3~5 粒。醫師會依照病人個別情況給予不同劑量，請遵照醫囑使用。應於**餐前至少 30 分鐘或餐後 2 小時服用**。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。**本藥需規律服藥，避免病菌產生抗藥性**。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏，或是有其他疾病，特別是曾對抗生素或抗結核病藥物有過敏、肝腎功能不良。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗凝血劑、類固醇、毛地黃製劑、口服降血糖藥、含氫氧化鋁之制酸劑、抗心律不整藥物 quinidine、免疫抑制劑 cyclosporin、抗黴菌藥 ketoconazole、抗癲癇藥 phenytoin。
3. **服藥期間禁止飲酒**，以免增加肝炎風險。



注意事項~續

- 4.請避免與大量乳酪、起司、紅酒等含有酪胺 (tyramine)的食物同時服用，以免造成藥物濃度提高。
- 5.服用本藥可能會使尿、糞便、唾液、汗液和淚液染成紅橙色(有戴隱形眼鏡者可能會著色)這是正常的不用擔心。
- 6.本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/視力模糊，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
- 7.本類藥品可能影響口服避孕藥之藥效，若有同時使用建議可使用第二種避孕方式。
- 8.老年人、營養不良者、糖尿病患者及青少年使用本藥治療時易出現神經感覺異常，建議可補充維生素 B6。
- 9.常見副作用為噁心、嘔吐、胃部不適、視力模糊、臉部潮紅、短暫肝功能異常、搔癢、周邊感覺異常(刺痛或緊繃感)，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
- 10.如果有下列症狀，請立刻就醫：突有任何急性肝臟疾病、異常肌肉疼痛或不尋常的虛弱感或痙攣、皮膚/眼白出現黃疸現象、肝功能異常、視神經炎(視力模糊/變化)、手腳麻痛腫脹、血清尿酸值升高(腎功能檢查值)、痛風發作、蕁麻疹或極罕見的嚴重皮膚不良反應(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等)。
- 11.懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師；本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。