



藥物成分
Amlodipine

劑型
口服藥

編號

☞ 藥品商品名及含量

諾怡錠 5 毫克/錠 (Nobar)

脈平錠 10 毫克/錠 (Amilo)

脈優錠 5 毫克/錠 (Norvasc)

壓可平錠 10 毫克/錠 (Amcopine)

☞ 藥品作用

可以放鬆血管，減輕心臟的負荷及增加心臟血液及氧氣的供給，用來治療高血壓及心絞痛。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次半~1 粒。
2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾對鈣離子阻斷劑(血壓藥)過敏。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他心血管藥物。
3. 可作為預防心絞痛發作，但不可作為急性發作時緩解。
4. 若覺得胸痛(心絞痛)變嚴重或頻率增加時要告訴您的醫師。
5. 本藥可能會有**暈眩或姿勢性低血壓**的副作用，如果從躺臥或坐姿要起立時應加小心，不要太快避免暈眩，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
6. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
7. 服藥初期可能會出現短暫頭痛現象，但一般會慢慢適應緩解。
8. 常見副作用為**頭痛、眩暈、周邊水腫(最常見在腳踝)、胃不舒服、極度疲倦、臉部潮紅(感覺發熱)、心灼熱感、心跳加快**，但一般都不嚴重，若症狀惡化無改善請回診告知醫師。
9. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**臉部眼睛嘴唇舌頭上臂或下肢的水腫、呼吸或吞嚥困難、昏厥、紅疹、皮膚或眼睛變黃。**
10. 懷孕分級為 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。