



藥物成分

Glimepiride

劑型

口服藥

編號

药品商品名及含量

胰美平錠 2 毫克/錠 (Glimepine)

瑪爾胰錠 2 毫克/錠 (Amaryl)

药品作用

本藥能增加胰島素分泌，也能讓人體能更有效的利用胰島素來降血糖，主要用來治療第二型(非胰島素依賴型)糖尿病。

服用方式

- 通常每日 1~2 次，建議飯前 15 分鐘或隨餐服用。
- 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

注意事項

- 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是酮酸中毒病史、腎臟或肝臟功能異常、乳糖吸收不良。
- 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是類固醇、抗凝血藥 warfarin、抗生素、降血壓藥或其他降血糖藥。
- 可能會有體重輕微上升的情形，可藉由飲食及運動控制。
- 請將本藥保存在幼童無法取得處，也不可給予別人使用。
- 服藥初期因血糖濃度改變，可能產生短暫性視力障礙，也可能有噁心嘔吐、腹瀉或腹痛等腸胃道不適，一般都不嚴重且會逐漸改善，若症狀惡化且無法忍受請回診。
- 服用本藥可能發生低血糖，請索取低血糖衛教單張號。**
- 本藥懷孕及哺乳期間都不建議使用，女性計畫懷孕或已懷孕或有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。