



藥物成分	劑型	編號
INH/ PZA/ RMP	口服藥	

◎ 藥品商品名及含量

(INH : Isoniazid , PZA : Pyrazinamide , RMP : Rifampicin)

衛肺特糖衣錠 80 毫克/250 毫克/120 毫克/錠 (Rifater)

◎ 藥品作用

結核病。

◎ 服用方式

1. 每天一次，每次服藥量依患者體重給藥，若小於 50 公斤者服用 4 錠。體重大於或等於 50 公斤者服用 5 錠。**應於飯前 1 小時或飯後 2 小時空腹服用。**
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。**本藥需規律服藥，避免病菌產生抗藥性。**若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

◎ 注意事項

1. 用藥前請告訴醫師或藥師是否對此藥物過敏，或有其他疾病，特別是肝腎功能異常、黃疸者，應小心使用並密切監測肝功能。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，phenytoin 、 quinidine 、 warfarin 、 fluconazole 、 itraconazole 、 ketoconazole 、 zidovudine 、 saquinavir 、 indinavir 、 efavirenz 、 barbiturates 、 benzodiazepine 、荷爾蒙類避孕藥等。
3. 服藥期間，不建議併用酒精，酒精可能會增加肝臟負擔。
4. 本藥可能會影響口服避孕藥，請使用第二種避孕方法。
5. 可能會出現橘紅色尿液或淚液 (若配戴隱形眼鏡可能會著色)。
6. 常見副作用為腸胃道不適、肝功能指數升高、皮疹過敏反應等，一般都不嚴重，但若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列罕見症狀，請立刻就醫：肝功能異常、胃口變差、黃疸、肝腫大等徵候。
8. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。