



藥物成分	劑型	編號
Sildenafil-1	口服藥	

药品商品名及含量

威而鋼膜衣錠 100 毫克/錠 (Viagra F.C.)

威而鋼口溶錠 50 毫克/錠 (Viagra orodispersible tablets)

药品作用

治療成年男性勃起功能障礙。

服用方式

1. 應於**性行為前約1小時**服用，每次半~1粒，服藥後30分~4小時是最適合進行性生活的時間。宜空腹服用避免食物影響藥物發揮效果時間。(與高脂食物併服時吸收較慢)
2. 口溶錠：可直接將口溶錠至於口中舌面上，待溶散後再用溫水送服(也可不用水直接吞服)；若需一次使用2顆口溶錠，應先等第一錠完全溶散後再服用第二錠。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。

注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是有肝腎功能問題、心血管疾病、不穩定型心絞痛、心臟衰竭及眼中風(單側視覺喪失)。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，**本藥禁止用於正在使用任何硝酸鹽類製劑(nitroglycerin) 或有機硝酸鹽類 (isosorbide、nitroprusside)**的病人，可能發生嚴重致命的低血壓，這類藥品常用於治療**狹心症或心絞痛**。
3. 本藥可能會讓人暈眩/視力模糊，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 請不要過度飲酒或食用葡萄柚(汁)，避免加重低血壓。
5. 服藥之後必須有性刺激才會有勃起反應。
6. 常見副作用為**頭痛/頭暈、潮紅感、消化不良、鼻塞、噁心**，但一般都不嚴重且暫時的，若症狀惡化無法忍受請回診。
7. **如果有下列症狀請立刻就醫：勃起持續超過4小時、聽力喪失/耳鳴、視覺異常/模糊、視覺顏色異常、嘔吐、嚴重暈眩/虛弱、心悸或其他嚴重不適。**