

藥物成分

劑型

編號

Cyclophosphamid

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

癌德星錠 50 毫克/錠 (Endoxan S.C.)

☞ 藥品作用

本藥可毒殺細胞，臨床主要作為抗腫瘤用途，因具有調節免疫的特性，也可作為紅斑性狼瘡或某些腎炎的治療。

☞ 服用方式

1. 通常一日 1~4 粒，請於早上服用，並配服大量開水。
2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是膀胱炎/尿道阻塞、骨髓受損、感染、心/肝/腎功能不良。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是降血糖藥(sulfonylurea)、allopurinol、hydrochlorothiazide、癲癇類藥物或接受放射性治療中。
3. 請勿食用葡萄柚(汁)及酒精性飲品，會使藥效降低。
4. 在醫師評估許可前，也請勿施打活性疫苗。
5. 這個藥品具有細胞毒性，請不要讓他人碰觸或誤食這個藥品，尤其是孩童/孕婦；如須磨粉請諮詢藥師處理方式。
6. 本藥可能會使您的免疫力降低，公眾場所請戴口罩，避免接觸傳染病患者或污物，勿生食，注意個人衛生避免受傷。
7. 常見的副作用有噁心、嘔吐、腹瀉、口腔炎、四肢皮膚或指甲變暗或變厚、掉髮、虛弱，一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
8. 如果有下列症狀，請立刻就醫：不明發燒/發冷、異常虛弱疲倦、皮膚發疹/紅斑、肺炎、喉嚨痛、不明的瘀血/出血、血尿/排尿疼痛、血便/黑便。
9. 懷孕等級 D，懷孕期間不建議使用，若女性計畫懷孕請告知醫師；本藥禁止於哺乳期間使用。