

藥物成分

劑型

編號

**Buprenorphine/
Naloxone**

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

舒倍生錠 2 毫克/錠 (Suboxone)

舒倍生錠 8 毫克/錠 (Suboxone)

☞ 藥品作用

鴉片類物質成癮之替代療法。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1~2 次，每次 1 粒。

2. 舌下投與。請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是甲狀腺功能低下、膽管機能不全、攝護腺肥大、肝、肺、腎功能不良病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是麻醉性止痛劑、benzodiazepines、鎮靜劑、安眠藥或其他中樞神經抑制劑。
3. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的鎮靜作用。
4. 常見副作用為頭痛、失眠、腹痛、便秘、噁心、嘔吐、盜汗，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 過量使用造成急性中毒，如有下列症狀，請立刻就醫：針狀瞳孔、嗜眠、低血壓、呼吸抑制。
6. 懷孕級數：C，若女性計畫懷孕請告知您的醫師；若您給嬰兒餵母乳，就診時請務必告知醫師。