

**藥物成分****劑型****編號****FTC+RPV+TDF****口服藥**

☞ 藥品商品名及含量

康普萊膜衣錠 Emtricitabine 200 毫克+ Rilpivirine 25 毫克+
Tenofovir 300 毫克/錠 (Complera F.C.)

☞ 藥品作用

此藥為複方三合一藥物，可以單獨用於治療病毒感染。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒，每日固定時間和食物併服。
2. 空腹服用或只和高蛋白質食物併服可能減少一半的藥效。
3. 病況改善也請確實繼續服藥，可避免病毒產生抗藥性，不然療程中吃吃停停會使藥物越來越沒效。如果您有現實的困難無法準時服藥，請與您的醫師/個管師/藥師討論。
4. 若不慎忘記服藥，請立即補服(忘記服藥時間小於 12 小時)，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師、藥師或個管師是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心血管疾病、精神相關疾病、骨質疏鬆症或曾有骨折、B 型肝炎及肝腎功能不良病史。
2. 請告訴醫師、藥師或個管師您是否有在服用其他藥物，如：癲癇藥物、抗肺結核藥物、胃食道逆流或胃潰瘍藥物、口服類固醇藥物。



注意事項 ~續

3. 若跟胃藥(制酸劑或 H₂ 接受體拮抗劑) 一起吃會影響藥效，需在服用本藥 2 小時之後才能吃胃藥，如果先吃了胃藥需等 4 小時之後才能服用本藥。
4. 服藥期間請避免服用聖約翰草。
5. 常見的副作用為嘔吐、腹瀉、頭痛、眩暈、疲倦、憂鬱疾患、失眠、異常作夢、皮疹、腹痛、骨骼疼痛、肌肉虛弱、體重減輕或紅疹、脂肪重新分布，**本類藥有諸多的副作用，有些可能會使您在生活上有些許不便，如果在忍受範圍內請您繼續服藥，但也勿忽視副作用的存在，若副作用過於嚴重致影響生活，請記錄下來回診與醫師討論，切勿自行停藥。**
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**皮膚或眼白變黃、嚴重腹痛、肌肉抽搐、茶色尿、灰白色便、異常疲倦(乳酸性酸中毒、肝腫大或肝毒性)、臉部或喉頭紅腫、搔癢、呼吸困難、胸悶、發燒、皮膚呈紫黑色、喘鳴。**
7. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。