



藥物成分	劑型	編號
Tramadol/ Acetaminophen	口服藥	

☞ 藥品商品名及含量

服安痛膜衣錠 37.5 毫克/325 毫克/錠 (Traceton F.C.)

妥美亭膜衣錠 37.5 毫克/325 毫克/錠 (Tramacet F.C.)

☞ 藥品作用

使用非鴉片類止痛劑無效的中度至嚴重性疼痛。

☞ 服用方式

1. 通常每 4~6 小時使用 1 次，每次 1~2 粒。
2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾經對 acetaminophen、tramadol 或鴉片類製劑過敏，肝腎功能不良，急性或嚴重氣喘。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是單胺氧化酶抑制劑(MAOI)、鴉片類藥物、抗凝血劑 warfarin。
3. 服藥期間請勿飲酒，酒精可能增加肝毒性或暈眩的副作用。
4. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性降低，**屬易跌倒藥品**，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械，服藥期間也應特別注意。
5. 常見副作用為發汗、便秘、頭痛、困倦、顫抖、暈眩、嗜眠、噁心、皮膚過敏反應等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列過敏症狀，請立刻停藥就醫：皮疹，蕁麻疹，瘙癢，皮膚紅腫，起水泡或脫皮；臉、嘴唇、舌頭或喉嚨發生腫脹，胸悶、呼吸困難。
7. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。