



藥物成分

劑型

編號

Capecitabine

口服藥

药品商品名及含量

截瘤達錠 500 公絲/錠 (Xeloda)

药品作用

Capecitabine是一種選擇性的細胞生長抑制劑，用於治療乳癌、結腸大腸癌、胃癌等疾病。

服用方式

- 通常每天 2 次，每次 1-5 粒，劑量依體表面積調整，應於飯後 30 分鐘內與水一起吞服。
- 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

注意事項

- 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對此藥或 fluorouracil 過敏、嚴重肝腎功能受損者。
- 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物或治療，特別是 warfarin、氫離子幫浦抑制劑、cimetidine、tamoxifen、phenytoin 或是施打化療藥品 docetaxel (紫杉醇)、活性疫苗。
- 本藥有骨髓抑制之副作用，可能會使白血球較低，請出入公共場合時戴口罩、勿生食(水果去皮)、不要接觸感冒的人/土壤/汙物/排泄物、小心避免自己受傷，並隨時注意自己有沒有感冒/喉痛、虛弱/發燒或小便灼熱疼痛等症狀。**
- 服用此藥物時建議監測血球數，若施打疫苗，應告知醫師。
- 常見副作用為白血球及血小板降低、腹瀉、噁心、嘔吐等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請立即回診。
- 如果有下列症狀，請立刻就醫：手足症候群(手及/或腳疼痛、腫脹或發紅)、口腔炎(口腔疼痛、發紅、腫脹)、嚴重貧血、發燒同時伴隨大面積皮膚脫屑。**
- 治療期間不可懷孕，建議應採取避孕措施，本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。