



藥物成分	劑型	編號
Rivaroxaban	口服藥	

☞ 藥品商品名及含量

拜瑞妥膜衣錠 10 毫克/錠 (Xarelto F.C. 10mg)

拜瑞妥膜衣錠 15 毫克/錠 (Xarelto F.C. 15mg)

☞ 藥品作用

防止血栓的形成，預防中風與栓塞。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。10 毫克的拜瑞妥餐前餐後皆可服用；15 毫克的拜瑞妥建議隨餐服用。
2. 若無法吞服整粒藥錠，可磨碎後與水/流質食物(如蘋果泥)混和後立即服用，服用後，也應再立即給予食物。胃管給藥時應磨碎並搭配少量水並於給藥後用水沖洗胃管。
3. 請依照醫師指示服藥，本藥作為預防栓塞需長期定時服用，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是嚴重進行性出血、胃潰瘍、凝血異常、肝腎功能不良。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 ketoconazole、HIV 蛋白酶抑制劑、ritonavir、rifampicin。
3. 如有要開刀或拔牙，請事先告訴醫師或牙醫師或藥師您正在服用此藥。
4. 避免從事可能造成出血的活動及盡量使用軟毛牙刷刷牙。
5. 常見副作用為貧血、腸胃道不適、頭暈、疲倦、頭痛、搔癢等，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：不尋常的出血(大面積嚴重瘀青)、血便/血尿/黑便、昏厥無力、虛弱、呼吸困難。
7. 無孕婦使用本藥品的安全性與有效性研究可參考，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。