

藥物成分

劑型

編號

3TC + ABC+DTG

口服藥

藥品商品名及含量

三思美膜衣錠 Lamivudine 300 毫克 + Abacavir 600 毫克 + Dolutegravir 50 毫克/錠 (Triumeq F.C.)

藥品作用

本藥為複方三合一藥物，可以單獨用於治療病毒感染。

服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒，需每日固定時間服用。
2. 病況改善也請確實繼續服藥，可避免病毒產生抗藥性，不然療程中吃吃停停會使藥物越來越沒效。如果您有現實的困難無法準時服藥，請與您的醫師/個管師/藥師討論。
3. 若不慎忘記服藥，請立即補服(忘記服藥時間小於 12 小時)，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

注意事項

1. 請告訴醫師/藥師/個管師是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心血管疾病、B型、C型肝炎或肝腎功能不良病史。
2. 請告訴醫師/藥師/個管師您是否有在服用其他藥，如抗病毒藥、降血糖藥(metformin)、rifampin、抗癲癇藥或精神疾病藥。
3. 服用含鈣、鎂或鋁的藥物或綜合維他命，需於2小時前或6小時後服用此藥物。請避免服用聖約翰草(St. John's wort)。
4. 常見副作用為噁心、腹瀉、頭痛、疲倦、失眠、食慾差、抑鬱、脂肪重新分布，**本類藥有諸多副作用，有些可能造成您生活上的不便，請在忍受範圍內繼續服藥，但也勿忽視副作用，若副作用影響生活，請記錄下來回診與醫師討論，切勿自行停藥。**
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**皮膚或眼白變黃、嚴重腹痛、肌肉抽搐、茶色尿、灰白色便、異常疲倦、臉部或喉頭紅腫、搔癢、皮膚疹、發燒、全身不適、呼吸困難、手腳刺痛/麻木、灼熱感、冷汗、胸悶、胸痛且蔓延至上臂、頸部與上背。**
6. 孕婦用藥等級C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。