



藥物成分

Hydralazine

劑型

口服藥

編號

药品商品名及含量

阿普利素寧糖衣錠 10 毫克/錠 (Apresoline)

药品作用

本藥物作用於血管擴張劑，可單獨或合併其他藥物治療高血壓。

服用方式

1. 每天 2-4 次，每次 1~5 粒。
2. 與食物併服會增加藥物作用，最好維持穩定的服藥與進食之間的關係性，避免藥物作用強度不一。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對 hydralazine 或 dihydralazine 過敏，或患有自發性全身性紅斑性狼瘡、充血性心臟衰竭、嚴重心搏過速。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其他類降血壓用藥、MAOI、三環抗鬱劑。
3. 常見副作用為心搏過速、心悸、頭痛等現象，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. **如果有下列症狀，請立刻就醫：紅斑狼瘡樣症狀(發燒、肌痛、皮膚疹、關節痛、貧血、皮膚病變)、末梢神經炎(感覺異常、鈍重感、刺痛感)。**
5. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。