

藥物成分

劑型

編號

Gimeracil/Oteracil /
Tegafur

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

愛斯萬膠囊 5.8 毫克/ 19.6 毫克/ 20 毫克/膠囊 (TS-1 20mg)

☞ 藥品作用

本藥品是一抗癌藥物，可減緩或停止您體內癌細胞的生長，主要用於胃癌術後輔助性化療。

☞ 服用方式

- 劑量根據體表面積和肝腎功能調整，通常一天 2 次，早、晚飯後，連續給予 28 天後，停藥 14 天，即為一個療程。
- 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

- 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是嚴重肝腎功能不良、嚴重骨髓抑制。
- 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗真菌劑 flucytosine、fluoropyrimidine 類抗腫瘤製劑、phenytoin、warfarin。
- 服用期間應監測血球數，若要施打疫苗，請詢問醫師/藥師。
- 本藥有骨髓抑制之副作用，可能會使白血球較低，請出入公共場合時戴口罩、勿生食(水果去皮)、不要接觸感冒的人/土壤/汙物/排泄物、小心避免自己受傷，並隨時注意自己有沒有感冒/喉痛、虛弱/發燒或小便灼熱疼痛等症狀。
- 常見的副作用有食慾不振、噁心、嘔吐、腹瀉、疲倦感、血球數減少、肝指數上升、口內炎、色素沉澱、皮疹等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
- 如果有下列症狀，請立刻就醫：出現任何感染症狀(如發燒、喉嚨痛等)、吞嚥困難、肝硬化。
- 有報告指出治療懷孕之婦女而產生畸胎之案例，服用本藥物應進行避孕措施，本藥可能會分泌到母乳裡，應中止哺乳。