



藥物成分	劑型	編號
<b>Estrogens conjugated</b>	<b>口服藥</b>	

## ☞ 藥品商品名及含量

伊使蒙膜衣錠 0.625 公絲/錠 (Estromon F.C.)

## ☞ 藥品作用

本藥為結合型雌性激素，可用於治療與停經有關血管性症狀(熱潮紅)、萎縮性陰道炎、女陰乾皸、女性生殖腺官能不足、原發性卵巢衰竭、荷爾蒙不平衡官能異常性子宮出血、停經後骨質疏鬆症(高危險群)。本藥還有其他臨床用途。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1~2 粒。劑量依病況而有所不同。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是有乳癌、子宮內膜癌、子宮內膜增生、中風、心肌梗塞、深層靜脈栓塞、肝功能不全病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 clarithromycin、ketoconazole、levothyroxine、etoricoxib。
3. 經常自我檢查乳房，如果有異樣的硬塊出現，立刻告訴醫師。
4. 常見副作用為噁心、嘔吐、食慾不振、體重改變、皮膚斑點等現象，但一般都不嚴重，若症狀惡化無法忍受請回診。
5. 如有下列症狀，請盡速回診：乳房脹痛或有分泌物、下肢水腫、不正常陰道出血。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重頭痛或嘔吐、皮膚搔癢、眼睛及皮膚變黃、突然的視力減弱或喪失、暈眩、胸痛、呼吸困難、關節不明脹痛、四肢腫脹。
7. 懷孕等級 X，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。