



藥物成分	劑型	編號
INH/ RMP	口服藥	

## ☞ 藥品商品名及含量 (INH：Isoniazid，RMP：Rifampicin)

樂肺寧[150]糖衣錠 (Rifinah 150 S.C.) 100+150 毫克/錠

樂肺寧[300]糖衣錠 (Rifinah 300 S.C.) 150+300 毫克/錠

## ☞ 藥品作用

Rifampicin和Isoniazid均為有效的抗菌性抗結核劑。這類藥物需正確連續服用，療程為6個月到2年不等。

## ☞ 服用方式

1. 通常每天 1 次，每次 2~3 粒。醫師會依照病人個別情況給予不同劑量，請遵照醫囑使用。應於**餐前至少 30 分鐘或餐後 2 小時服用**，可以和其他的抗結核劑併服。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。**本藥需規律服藥，避免病菌產生抗藥性**。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**慢性肝炎、黃疸、腎功能不全**。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，因 RMP 可能誘導代謝酵素，因而影響其他藥物的藥效。
3. **請避免飲酒**，以免增加肝炎風險。
4. 請避免與大量乳酪、起司、紅酒等含有酪胺 (tyramine) 的食物同時服用，以免造成藥物濃度提高。
5. 本藥可能會使尿液、汗液、痰及淚液的顏色變紅，若有配戴軟性隱形眼鏡可能被染色，這是正常的不用擔心。



## 注意事項~續

6. 老年人、營養不良者、糖尿病患者及青少年使用本藥治療時易出現神經感覺異常，建議可補充維生素 B6。
7. 少數人服用本藥可能會讓人暈眩/嗜睡，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
8. 本類藥品可能影響口服避孕藥之藥效，若有同時使用建議可使用第二種避孕方式。
9. 常見副作用為噁心、嘔吐、腹瀉、輕微腹痛、腹痛、頭暈、疲倦、皮膚感覺不適，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
10. 如果有下列症狀，請立刻就醫：偽膜性結腸炎(腹瀉[可能帶有血便或膿便]、腹痛、發燒、嘔吐)、異常肌肉疼痛或不尋常的虛弱感或痙攣、皮膚/眼白出現黃疸現象、肝功能檢查異常、蕁麻疹或極罕見的嚴重皮膚不良反應(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等)。
11. 本藥未針對孕婦做過良好的對照性研究，因此醫師對孕婦或可能懷孕者會衡量利弊才可使用。
12. 本藥中的兩種成份 rifampicin 及 isoniazid 會進入母體乳汁，只有在藥品對嬰兒的潛在利益大於其風險時才能使用，有哺乳需求請事先諮詢醫師/藥師。