

藥物成分

劑型

編號

Phenytoin

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

癲能停膠囊 100 毫克/膠囊 (Dilantin Kapseals)

## ☞ 藥品作用

Phenytoin 可用來治療各種類型的癲癇痙攣或抽搐。此藥作用於腦部及神經系統用於治療癲癇。本藥尚有其他臨床用途，請詢問您的醫師或藥師。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 2~3 次，每次 1 粒。
2. 即使您已感覺好轉，仍應繼續服用此藥；未經醫師同意前，不可自行停用此藥，尤其是已經服用大劑量一段時間後；突然停藥可能導致抽搐，醫師可能會逐漸降低劑量。
3. **請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。** 若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是禁止與 delavirdine 併用，其他如：酒精、抗生素 (erythromycin, sulfonamide, chloramphenicol, isoniazid(INH), rifampin)、抗黴菌藥(ketoconazole, fluconazole)、血清素再吸收抑制劑(flvoxetine, fluvoxamine, sertraline)、鎮靜安眠劑(diazepam)、theophylline 等。
3. 使用本藥常見副作用大多發生於中樞神經系統，且通常與劑量有關，故須仔細監控以調整 phenytoin 之劑量。
4. 常見副作用為頭昏、失眠、短暫緊張、運動痙攣、頭痛、感覺異常，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. **如果有下列症狀，請立刻就醫：昏迷、呼吸困難、流鼻血、容易瘀血、皮膚疹。**
6. 懷孕等級 D，**女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。**