



藥物成分

劑型

編號

Carvedilol

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

心全錠 6.25 毫克/錠 (Syntrend)

慢又低膜衣錠 25 毫克/膠囊 (Longcardio F.C)

## ☞ 藥品作用

含  $\alpha_1$ 、 $\beta_1$ 、 $\beta_2$  受體阻斷性質的腎上腺素接受器阻斷劑，可治療高血壓、冠狀心臟疾病、慢性心衰竭。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 2 次，服用劑量需依照個別病患適應做調整。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。  
若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心臟衰竭、肝功能不良、嚴重房室傳導障礙、心跳過慢、心因性休克、支氣管痙攣或氣喘病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是毛地黃、amiodarone、verapamil、diltiazem、cyclosporin、rifampin、cimetidine。
3. 因為這個藥會讓心跳變慢，糖尿病病友服用後可能使低血糖副作用發生時的心跳過速不明顯，請病友注意。
4. **本藥用來保護心臟時需長期定時服用**，若已長期服用未經醫師許可**請勿任意突然停藥**，可能會導致病情惡化。
5. 常見副作用為頭痛、心跳過慢、低血壓、疲倦無力、頭暈，偶爾可能會引起皮膚紅疹、腸胃不適，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**嚴重低血壓、心臟過慢、呼吸困難、意識混亂、全身性痙攣發作。**
7. 此藥物會減少胎盤灌流、不能排除危險性，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，**本藥可能會分泌到母乳裡**，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。