



藥物成分

劑型

編號

Pravastatin

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

美百樂鎮錠 40 毫克/錠 (Mevalotin Protect)

安樂脂錠 40 毫克/錠 (Dehypotin Protect)

## ☞ 藥品作用

本藥可減慢體內膽固醇的生成，主要用來治療高膽固醇血症及高三酸甘油酯血症，減少發生心血管疾病或中風的機會。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒，建議**晚飯後或睡前**服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**肝臟或腎臟**方面的疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物(包含健康食品)，特別是 cyclosporine、erythromycin、clarithromycin 或其他降血脂藥。
3. 服藥期間**請勿飲酒**，酒精可能會加重此藥之副作用。
4. 副作用相當少見，但有可能發生：**頭痛、消化不良、噁心、腹瀉**，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**若出現眼睛/皮膚變黃、茶色尿液(黃疸)、右上腹疼痛、不明原因的肌肉疼痛、肌肉無力或痙攣**，尤其伴有全身不適、虛弱或發燒的現象。。
6. 懷孕等級 X，女性計畫懷孕或已懷孕請先告知醫師；服藥期間不可哺餵母乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。