



# 藥物成分

## Imatinib

# 劑型

## 口服藥

# 編號

### 药品商品名及含量

基利克膜衣錠 100 毫克/錠 (Glivec F.C.)

### 药品作用

抗腫瘤標靶藥，可干擾癌細胞訊息傳遞，減緩或停止癌細胞生長，用於治療慢性骨髓性白血病或胃腸道基質瘤等疾病。

### 服用方式

- 通常每日 1 次，每次 4~6 粒，配合一大杯水**隨餐服用**。
- 無法吞服膜衣錠之病人，每錠可泡在一大杯水或蘋果汁(50 毫升)中攪拌，崩解後立即服用。
- 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

### 注意事項

- 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是甲狀腺疾病、肝/腎功能不良、心臟疾病、B 肝帶原。
- 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其他化療藥物或近期有施打活性疫苗，CYP3A4 誘導劑(抗癲癇藥、巴比妥類、rifampicin、聖約翰草)、CYP3A4 抑制劑(azole 類抗黴菌藥、clarithromycin)、cyclosporin 或 pimozide、dihydropyridine 類鈣離子阻斷劑、statins 類膽固醇藥。
- 本藥可能會讓人暈眩/視線模糊，**是易致跌藥物**，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械，服藥期間也應特別注意。
- 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁，可能會影響藥物代謝
- 若長期使用建議定期檢測血球及肝腎功能。
- 常見副作用為疲倦、頭痛、視力模糊、噁心、腹瀉、嘔吐、抽筋、肌肉痛、皮疹、表皮水腫(常見於眼眶周圍或下肢水腫)，但一般不嚴重，若症狀惡化請回診。
- 服藥後若發生下列症狀，請立刻就醫或回診：嚴重水腫、體重快速增加、喘鳴/呼吸困難、血/黑便、嚴重嗜中性白血球或血小板減少(嚴重虛弱、發燒、紫斑)、黃疸(眼白/皮膚變黃)。
- 服藥期間建議採取避孕措施且不建議哺乳。