



藥物成分

劑型

編號

Felodipine

口服藥

## 藥品商品名及含量

順壓樂持續釋放膜衣錠 5 毫克/錠 (Fedil S.R.)

紛落持續釋放膜衣錠 10 毫克/錠 (Felopine E.R. F.C.)

## 藥品作用

高血壓、心絞痛。

## 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒，可空腹或與食物一起服用，本類藥物皆為緩釋劑型，請整粒吞服，不可剝半或磨粉。
2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾對鈣離子阻斷劑(血壓藥)過敏。  
請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他心血管藥物，特別是毛地黃(digoxin)、β阻斷劑、抗凝血劑、quinidine、抗癲癇藥、rifampin、cimetidine、lithium 或 cyclosporine。
2. 若覺得胸痛(心絞痛)變嚴重或頻率增加時要告訴您的醫師。
3. 本藥可能會有**暈眩或姿勢性低血壓**的副作用，如果從躺臥或坐姿要起立時應小心，不要太快避免暈眩，服藥初期在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁，也須避免過量飲酒。
5. 曾有罕見牙齦腫大的副作用，服用本藥請記得日常口腔清潔。
6. 常見副作用為潮紅、周邊水腫、頭痛、心悸、暈眩、疲倦，但一般都不嚴重且會慢慢適應，若症狀惡化無改善請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**臉部眼睛嘴唇舌頭上臂或下肢的水腫、呼吸或吞嚥困難、昏厥、紅疹、皮膚或眼睛變黃。**
8. 懷孕等級 C，目前懷孕安全性資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕就診時請務必告知醫師。哺乳資料不足以排除嬰兒風險，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。