



藥物成分

劑型

編號

Captopril

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

安保康錠 12.5 毫克/錠 (Apo-capto)

☞ 藥品作用

嚴重度高血壓、腎血管性高血壓、以及對傳統治療之高血壓無理想效果或發生不良副作用之病人。

☞ 服用方式

1. 通常每天 2 次，每次 1-2 顆，建議飯前 1 小時服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是血管性水腫，腎功能不良、血鉀過高。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是交感神經用藥、其他降血壓類的藥物、spironolactone、aspirin、鋰。
3. 請避免吃過量高鉀食品，若要使用低鈉鹽請事先諮詢醫師。
4. 如有需全身麻醉手術，請事先告訴醫師正在服用此藥。
5. 常見副作用為乾咳、血壓降低、皮膚疹、頭暈等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：血管水腫(常見於眼唇腫起來)，臉部、舌頭、聲門及喉頭腫脹，導致嚴重性呼吸短促的現象。
7. 胎兒的風險已被證實有傷害，女性計畫懷孕或已懷孕請務必告知您的醫師，本藥分泌到母乳的量不明，但考量嬰兒風險建議勿哺乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。