



藥物成分

劑型

編號

Valsartan

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

得安穩膜衣錠 160 毫克/錠 (Diovan F.C.)

舒心樂膜衣錠 160 毫克/錠 (Valsart F.C.)

☞ 藥品作用

本藥為一種血管收縮素 II 受體拮抗劑，用於治療高血壓、心衰竭 (NYHA 二到四級)、心肌梗塞後左心室功能異常。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是有腎臟、肝臟或其他心血管疾病；準備懷孕或哺乳。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 cyclosporines、rifampin、ritonavir、保鉀利尿劑、鉀離子補充劑、非類固醇抗發炎止痛劑。
3. 請避免吃過量高鉀食品，若要使用低鈉鹽請事先諮詢醫師。
4. 如有需全身麻醉手術，請事先告訴醫師正在服用此藥。
5. 常見副作用為頭暈、頭痛、姿勢性低血壓(坐臥姿變換站姿時易頭暈)、乾咳、腸胃不適等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：意識混亂，心跳不規律，呼吸急促(以上可能是血鉀過高造成)、過敏反應(皮膚疹、舌頭喉嚨腫起來、搔癢或蕁麻疹)、水腫、排尿量改變。
7. 胎兒的風險已被證實有傷害，女性計畫懷孕或已懷孕請務必告知您的醫師，哺乳資料不足，不建議用於哺乳期間。