



藥物成分	劑型	編號
Emtricitabine/ Tenofovir	口服藥	

☞ 藥品商品名及含量

舒發泰膜衣錠 FTC 200 毫克+TDF 300 毫克/錠 (Truvada F.C.)

☞ 藥品作用

合併其他抗病毒藥物可治療病毒感染，特殊情況經醫師指示可用於高風險族群之暴露前預防性投藥。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒，需每日固定時間服用。
2. 病況改善也請確實繼續服藥，可避免病毒產生抗藥性，不然療程中吃吃停停會使藥物越來越沒效。如果您有現實的困難無法準時服藥，請與您的醫師/管理師/藥師討論。
3. 若不慎忘記服藥，請立即補服(忘記服藥時間小於 12 小時)，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝腎功能不良、B 型肝炎、骨質疏鬆症或骨折。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 若本藥作為預防性投藥，還是建議使用保險套，有以下症狀請立刻就醫：類流感症狀(發燒、頭痛、疲倦、關節痛、嘔吐、肌痛、咽喉炎、紅疹、夜間盜汗、頸淋巴結或腹股溝處腫大)。
4. 常見副作用有皮疹、腹瀉、頭痛、疲倦、多夢、失眠、抑鬱、噁心、眩暈，**本類藥物有諸多副作用，有些可能造成您生活上的不便，請在忍受範圍內繼續服藥，但也勿忽視副作用，若影響到生活，請記錄下來回診與醫師討論，切勿自行停藥。**
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**乳酸性酸中毒(肌肉不明異常痠痛、呼吸困難、暈眩發冷)、肝腫大或肝毒性(皮膚或眼白變黃、嚴重腹痛、肌肉抽搐、茶色尿、灰白色便、異常疲倦)、臉部或喉頭紅腫、搔癢、胸悶、發燒、皮膚呈紫黑色、喘鳴。**
6. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕，就診時請務必告知醫師。本藥會分泌到母乳裡，服藥期間請勿哺乳。