



藥物成分

劑型

編號

Dipyridamole

口服藥

药品商品名及含量

立達脈膜衣錠 25 毫克/錠 (Anginar F.C.)

待匹力達糖衣錠 25 毫克/錠 (Dipyridamole S.C.)

暢心膜衣錠 50 毫克/錠 (Sancin F.C.)

沛暢膜衣錠 75 毫克/錠 (Peysan F.C.)

药品作用

本藥可防止血液凝固，對慢性狹心症有幫助，也可與其他藥併用來降低心臟瓣膜手術後血栓發生的危險性。

服用方式

- 通常每日 1~3 次，每次 1 粒。建議餐前 1 小時或餐後 2 小時服用，但若出現腸胃不適或服藥不方便也可飯後使用。
- 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

注意事項

- 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是凝血方面疾病、重症肌無力或低血壓病史。
- 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗血小板藥物 aspirin、抗凝血藥。
- 如果有要開刀或拔牙，請告訴其他科別的醫師或牙醫師或藥師您正在服用此藥。
- 本藥可能會有姿勢性低血壓的副作用，如果從躺臥或坐姿要起立時應加小心，不要太快避免暈眩。
- 常見副作用為眩暈、胃痛、頭痛、皮疹、腹瀉、嘔吐、臉紅(感覺熱)、皮膚搔癢，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
- 如果有下列症狀，請立刻就醫：不正常出血或瘀血、皮膚或眼睛變黃、胸痛。**
- 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師；對嬰兒哺乳的風險未明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。