



藥物成分

劑型

編號

Gabapentin

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

鎮頑癲 300 毫克/膠囊 (Neurontin)

## ☞ 藥品作用

本藥主要治療成人及三歲以上兒童局部癲癇發作之輔助療法、帶狀疱疹後神經痛。

## ☞ 服用方式

1. 通常一日 3 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，例如：腎功能不良。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是減肥藥物(如:Xenical 羅氏鮮)。制酸劑併服，需間隔兩小時以上。
3. **本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性/協調能力降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。**
4. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的鎮靜作用。
5. 常見副作用為嗜眠、暈眩、運動失調、倦怠、眼球震顫，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 當您發生下列症狀時，請立刻就醫：皮膚疹、癢、移動或呼吸困難、笨拙、發燒、類似感冒症狀、心跳不正常、癲癇發作。
7. 懷孕等級:C，目前對胎兒風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。