

藥物成分

劑型

編號

Ramipril

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

心達舒錠 2.5 毫克/錠 (Tritace)

☞ 藥品作用

血管收縮素轉化酵素抑制劑，藉由阻斷血管張力素 II 的生成而使周邊血管阻力降低，用以治療高血壓、心肌梗塞後的心衰竭。

☞ 服用方式

1. 高血壓通常每日一次，每次 1~2 粒。
2. 心肌梗塞後心衰竭，通常每日兩次，每次每次半~1 粒。
3. 整粒吞服、勿咬碎。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腎功能不全者、雙側腎動脈狹窄患者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是保鉀型利尿劑。
3. 如有需全身麻醉手術，請事先告訴醫師正在服用此藥。
4. 常見副作用為乾咳、頭痛、頭暈、血管神經性水腫、高血鉀，一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**血管水腫(常見於眼唇腫起來)**，臉部、舌頭、聲門及喉頭腫脹，導致嚴重性呼吸短促的現象。
6. 懷孕等級 D 級，於懷孕第二期或第三期曾發生死胎或新生兒死亡，如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師/藥師。